




# Procedura di Primo Soccorso in Asilo

**Protocolli operativi per la corretta gestione  
di base delle emergenze sanitarie pediatriche**



**Ed. 01 - Rev. 00 del 01/01/2022**

Procedure elaborate in base alle indicazioni dell'OPBG di Roma



## **CODICE VERDE** **Nessuna Emergenza Sanitaria**

### **Quando?**

- FEBBRE OLTRE I 37,5°C
- PUNTURE DI INSETTI
- PEDICULOSI
- DIARREA
- VOMITO
- TOSSE PERSISTENTE
- CONGIUNTIVITE

### **Cosa fare?**



Intervento di cura e assistenza del personale



Contatto con i genitori




Eventuale allontanamento dall'asilo



Eventuale compilazione modulo allontanamento

# Procedura di Primo Soccorso in Asilo



## **CODICE GIALLO** **Emergenza Sanitaria Secondaria**


### **Quando?**

- TRAUMA CRANICO
- CONVULSIONI
- PERDITA DI SANGUE DA GENGIVE, ORECCHIO O NASO
- BRUCIATURE E USTIONI LIEVI
- CORPI ESTRANEI
- CONTUSIONI
- COLPO DI FREDDO O DI CALDO
- LESIONI CUTANEE

### **Cosa fare?**



- 1** Intervento di Primo Soccorso del personale
- 2** Contatto immediato con segreteria Ludus
- 3** Valutazione ed eventuale allertamento 112/118
- 4** Contatto con i genitori
- 5** Relazione accaduto e compilazione modulo incidenti



## **CODICE ROSSO** **Emergenza Sanitaria Primaria**

### **Quando?**

- SINCOPE (SVENIMENTO)
- LESIONI GRAVI CON EMORRAGIA
- SVENIMENTO (SINCOPE)
- OSTRUZIONE DELLE VIE AEREE
- ARRESTO RESPIRATORIO

### **Cosa fare?**



- 1** Intervento di Primo Soccorso del personale
- 2** Allertamento immediato del NUE 112/118
- 3** Contatto con i genitori
- 4** Contatto immediato con segreteria Ludus
- 5** Relazione accaduto e compilazione modulo incidenti

## Indicazioni generali

- 1** In caso di emergenza sanitaria, sono tenuti all'intervento in via preliminare gli Addetti al Primo Soccorso e successivamente tutti gli altri
- 2** La Coordinatrice si rapporta con la C.O. 112/118 e con segreteria Ludus
- 3** Durante l'emergenza è necessario tenere libere le linee telefoniche fisse (ove presenti)
- 4** E' assolutamente vietato trasportare all'ospedale con il proprio mezzo un bambino infortunato, ma attendere sempre l'arrivo del 118/112
- 5** Non tentare mai di effettuare manovre che vanno al di là delle proprie capacità e/o abilità pratiche e tecniche
- 6** In caso di emergenza fare qualcosa, seguendo le linee guida, è comunque meglio che non far nulla
- 7** Avvisare sempre la C.O. 112/118 che si tratta di un minore



# Procedura di Primo Soccorso in Asilo

## Come effettuare la chiamata di emergenza

**1**

Mantenere la calma



**2**

Identificarsi comunicando chiaramente nome, cognome e asilo dal quale si chiama

**3**

Indicare un numero al quale essere rintracciati e la posizione esatta includendo la via, numero civico e altre indicazioni utili; se l'asilo si trova lungo una strada fuori città, aggiungere dei punti di riferimento, la distanza e la direzione del senso di marcia o eventuali altri ostacoli per l'accesso dei soccorsi

**4**

Descrivere chiaramente l'emergenza sanitaria, avendo cura di specificare che si tratta di un minore e di un asilo

**5**

Descrivere l'intervento di primo soccorso messo in atto o che si sta praticando

**6**

Ascoltare le indicazioni dell'operatore e non chiudere la comunicazione fin quando non chiude l'operatore stesso



**ATTENZIONE**




NUMERO UNICO  
PER TUTTE  
LE EMERGENZE:

Emergenza

(112)

Verificare nella propria Regione se già attivo il NUE 112



## Febbre oltre i 38°C

### Indicazioni generali

- La febbre merita attenzione sopra i 38°C
- Sotto i 24 mesi, effettuare la misurazione rettale, scalando 0,50°C
- Nei bambini la temperatura corporea può aumentare anche dopo attività fisica, sudorazione e pasti

### Cosa fare?



Somministrare liquidi al bambino



Togliere gli indumenti al bambini e mantenerlo fresco in attesa dell'arrivo dei genitori




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se abbinata a febbre oltre i 38°C si manifestano:

- difficoltà respiratoria
- rigidità del collo
- stato confusionale
- convulsioni
- dolore addominale



## Puntura di insetto

### Indicazioni generali

- Diversi insetti con pungiglione, pungendo la pelle, iniettano sostanze nocive che provocano bruciore, rossore, dolore e prurito. Questa reazione è assolutamente normale se localizzata nella sede della puntura e se è limitata nell'estensione, nella gravità e nella durata.

### Cosa fare?



Rimuovere entro 20 secondi il pungiglione, se è visibile, con un movimento secco e rapido (usando le unghie o le pinzette).



Applicare del ghiaccio e lasciare riposare la parte lesa




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- pallore
- nausea
- vomito improvviso
- esantema diffuso
- difficoltà respiratorie



## Trauma cranico

### Indicazioni generali

- E' indispensabile effettuare una rapidissima valutazione dell'entità del trauma/urto/impatto occorso al bambino

### Cosa fare se LIEVE O MODERATO?



Applicare ghiaccio per almeno 20 minuti



Se l'evento è accaduto prima del pranzo, somministrare una dieta leggera (in bianco)



Tenere il bambino sotto stretta osservazione, in particolar modo durante il riposo

### Cosa fare se VIOLENTO?



Applicare ghiaccio per almeno 20 minuti e allertare il 112/118




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- perdita di coscienza
- vomito improvviso
- perdita di sangue da naso, orecchio o bocca
- sonnolenza improvvisa
- mal di testa persistente
- difficoltà dei movimenti



## Convulsioni

### Indicazioni generali

- La maggior parte degli attacchi convulsivi si risolvono entro pochi minuti.

### Cosa fare?



Mantenere la calma



Stendere a terra il bambino sul fianco sinistro in posizione supina, facendo attenzione a tenere la testa voltata sul fianco



Allentare l'abbigliamento soprattutto intorno al collo



Non cercare di bloccare i movimenti del corpo, non forzare l'apertura della bocca e non inserire nulla in bocca



Non tentare di estrarre la lingua e attendere la fine dell'attacco




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- perdita di coscienza persistente
- perdita di feci e urine
- difficoltà respiratorie



## Perdita di sangue da gengive, orecchio e naso

### Indicazioni generali

- La maggior parte delle epistassi si risolvono in breve tempo

### Cosa fare? Sangue dalle gengive



Tenere il bambino seduto e far leccare un ghiacciolo (se possibile)



Porre la testa del bambino in avanti fino all'arresto del flusso

### Cosa fare? Sangue dall'orecchio



Se il taglio è esterno, comprimere con una garza la ferita



Se il sanguinamento proviene dall'interno, non tamponare e non comprimere, bendare tutta la testa e far distendere il bambino con la testa più alta del corpo voltata verso l'orecchio sanguinante

### Cosa fare? Sangue dal naso



Comprimere la punta del naso per almeno 3/5 minuti con le dita, porre la testa del bambino in avanti e non farlo sdraiare



Applicare ghiaccio sulla nuca o sulla fronte senza posizionare tamponi o garze nel naso




**ATTENZIONE**



## Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- sanguinamento persistente oltre i 20 minuti



## Corpi estranei

### Indicazioni generali

- E' necessario effettuare un'accurata valutazione prima di intervenire

### Cosa fare? Nell'occhio



Non far sfregare l'occhio con le mani



Sedersi alla luce e con le mani pulite



Far guardare verso l'alto e tirare delicatamente verso il basso la palpebra inferiore per eliminare il corpo estraneo



Se il corpo estraneo è sotto la palpebra superiore far guardare verso il basso, afferrare la palpebra superiore e abbassarla delicatamente sopra la palpebra inferiore

### Cosa fare? Nell'orecchio



Non tentare di estrarre l'oggetto con le mani



Se si tratta di un insetto, piegare la testa con l'orecchio verso l'alto, versare poca acqua tiepida e pulita e verificare se l'insetto emerge




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- sanguinamento
- corpo estraneo impossibile da rimuovere (es. insetto)



## Contusioni

### Indicazioni generali

- E' necessario effettuare un'accurata valutazione circa la gravità della contusione prima di intervenire

### Cosa fare?



1 Applicare ghiaccio per almeno 20 minuti



2 Far tenere la parte lesionata a riposo nella posizione più comoda per il bambino



3 Se dolorante far innalzare l'arto




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- deformità della parte contusa rispetto alla parte sana
- assenza di movimenti spontanei
- incapacità di afferrare oggetti
- incapacità di camminare



## Colpo di freddo o di caldo

### Indicazioni generali

- E' necessario effettuare un'accurata osservazione del bambino

### Cosa fare? Colpo di freddo



Coprire il bambino e somministrare una bevanda calda



Mantenere a riposo il bambino

### Cosa fare? Colpo di calore



Porre il bambino al riparo dal sole in un ambiente fresco



Togliere tutti gli indumenti (eccetto gli slip) e umidificare il corpo con una spugna imbevuta di acqua fresca



Somministrare acqua fresca e mantenere il bambino a riposo




**ATTENZIONE**



## Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- perdita di coscienza
- impossibilità a far assumere liquidi



## Lesioni cutanee

### Indicazioni generali

- E' necessario effettuare un'accurata medicazione della ferita e un'attenta valutazione della situazione. In caso di escoriazioni, abrasioni e lesioni cutanee superficiali è possibile provvedere alla medicazione e alla risoluzione dell'incidente

### Cosa fare?



Detergere la cute intatta intorno alla ferita con soluzione disinfettante e irrorare invece con soluzione fisiologica la parte lesa



Comprimere con il pollice e le dita la ferita



Praticare un bendaggio compressivo con garze e bende




**ATTENZIONE**



### Quando allertare il 112/118?

Allertare la C.O. 112/118 se compaiono i seguenti sintomi:

- ferite da taglio
- ferite da punta
- ferite lacero-contuse
- emorragia



## Sincope (svenimento)

### Indicazioni generali

- Possono esserci diverse cause alla base di una sincope ed è sempre bene conoscere eventuali patologie di cui il bambino è affetto, in modo da poter valutare la situazione in maniera adeguata

### Cosa fare?



Stendere il bambino al suolo in posizione antishock con le gambe sollevate ed allentare eventuale abbigliamento



Tenere il bambino sotto stretta osservazione e monitorare i parametri vitali (battito, respiro ecc)




Arieggiare l'ambiente



**ATTENZIONE**



**Allertare sempre il 112/118**



## Lesioni/ferite gravi con emorragia

### Indicazioni generali

- In attesa dell'arrivo del 112/118 è bene tenere la parte sanguinante quanto più in alto possibile

### Cosa fare?



Detergere la cute intatta intorno alla ferita con soluzione disinfettante e irrorare invece con soluzione fisiologica la parte lesa



Comprimere con il pollice e le dita la ferita



Praticare un bendaggio compressivo con garze e bende




Se la perdita di sangue continua e non si arresta, non togliere il bendaggio già effettuato ma aggiungere nuove bende continuando a comprimere e a tenere in alto la zona interessata



**ATTENZIONE**



**Allertare sempre il 112/118**



## Avvelenamento/Intossicazione

### Indicazioni generali

- In attesa dell'arrivo del 112/118 è bene tenere il bambino disteso al suolo supino e posizionato sul fianco sinistro

### Cosa fare?



Non tentare di procurare il vomito



Conservare l'eventuale fonte di avvelenamento/intossicazione in modo da agevolare la diagnosi del medico di PS



Non somministrare liquidi o alimenti al bambino




Contattare un Centro Antiveleno  
ROMA: 0668593726



**ATTENZIONE**



**Allertare sempre il 112/118**



## Ostruzione delle vie aeree

### Indicazioni generali

- In linea generale una corretta prevenzione all'interno dell'asilo ed una corretta somministrazione dei pasti, sono elementi di forte riduzione del rischio

### Cosa fare? Se Lattante 0-12 mesi




Alternare 5 pacche interscapolari a 5 compressioni toraciche

### Cosa fare? Se Bambino dai 12 mesi



Praticare la Manovra di Heimlich



**Se le manovre sono inefficaci ed il bambino perde coscienza, pratica la rianimazione cardiopolmonare fino all'arrivo del 112/118**



**ATTENZIONE**



**Allertare sempre il 112/118**